

表5—3 作目別栽培実績(平成12年度)

作目	圃場	面積 (ha)	品 種	播種日 (月/日)	栽植密度 (cm)	播種量 (10a)	施肥量(kg/10a)							収量(kg)			
							化成*	硫安	重過石	熔燐	珪カル	苦土石灰	堆肥**	成分量	総面積当	10a当	
水 稲	1号	6.00	ひとめぼれ	4/7	30×14	4kg	50			20	100		3,000	N	7.0	31,440	524
	3号		ひとめぼれ	3/23~28	33×15	2kg(ポット苗)								P	14.0		
	4号		まなむすめ	4/7	30×14	4kg								K	7.0		
バレイショ	3号	0.38	男 爵	4/17	72×30	200kg	100							N	20.1	9,866	2,596
													P	15.0			
													K	15.0			
アズキ	3号 21号	1.00	紅大納言	6/19	75×15	4 $\frac{1}{2}$ kg	100					200		N	5.0	630	63
													P	15.0			
													K	20.0			
ニンジン	3号	0.10	鮮紅大長	6/7	72条播	1 $\frac{1}{2}$ kg	120	40						N	26.4	1,012	1,012
													P	18.0			
													K	18.0			
ゴボウ	3号	0.10	滝野川	5/23	72条播	1 $\frac{1}{2}$ kg	120	40						N	26.4	1,150	1,150
													P	18.0			
													K	18.0			
ナガイモ	3号	0.06	トロフィー	5/15	120×20	33kg	200							N	30.0	1,149	1,915
													P	30.0			
													K	30.0			
ニンニク	21号	0.20	福地 ホワイト 6片	9/28~29	15×15	225kg	180	20	170	150			4,000	N	29.4	1,326	663
													P	116.6			
													K	18.0			
ブルーベリー	3号	0.10	ハイブッシュ	(移植日) 1998/4/10 1998/4/13	200×150		23	15						N	6.0	25.8	26
													P	2.3			
													K	2.3			
ウメ	2号 5号	5.10	白加賀等													1,972	39

*水稲は、とるぞうくん(14-20-14%)、バレイショ、長芋は、LPコーン専用(15-15-15%)、アズキは、大豆化成550号(5-15-20%)、ニンジン、ゴボウは、LP苦土安1号(15-15-15%)、ニンニクはニンニクエース(14-16-10%)、ブルーベリーはブルーベスト(12-10-10%)を使用した。

**3号水田の堆肥試験区は、それぞれ0t/10a区41.3a,1t/10a区41.7a,および3t/10a区43.9aである。