

表 7-5 黒毛和種の肥育成績

番号	個体番号	性別	生年月日	肥育開始日	開始体重 (kg)	開始月齢 (ヵ月)	肥育期間 (月)	出荷月齢 (ヵ月)	出荷時期	出荷体重 (kg)	肥育期間 DG (kg)	枝肉重量 (kg)	歩留基準値	格付け	BMS	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	瑕疵	備考	
1	B1767	去勢	H23. 8.26	H24. 4.20	222	7.9	23.1	31.0	H26. 3.13	772	0.79	465.0	76.3	A-4	7	73	8.6			
2	B1768	去勢	H23. 8.29	H24. 4.20	232	7.8	23.1	30.9	H26. 3.13	830	0.86	494.0	75.1	A-3	4	62	8.0			
3	B1772	去勢	H23.10.11	H24. 4.20	222	6.4	23.1	29.5	H26. 3.13	702	0.69	421.0	71.7	A-3	5	50	6.4			
4	B1749	雌	H23. 5.27	H24. 5. 8	247	11.6	22.4	34.0	H26. 3.11	566	0.47	352.5	74.7	A-4	8	54	6.8	カツジョ (バラ)		
5	B1756	雌	H23. 6.14	H24. 5. 8	248	11.0	22.4	33.4	H26. 3.11	696	0.67	425.0	74.2	A-5	9	63	7.6			
6	B1743	雌	H23. 5. 9	H24. 5. 8	301	12.2	22.2	34.4	H26. 3. 6	706	0.61	439.5	73.9	A-5	10	61	7.4			
7	B1750	雌	H23. 5.31	H24. 5. 8	262	11.4	22.2	33.7	H26. 3. 6	714	0.68	449.5	74.6	A-3	5	70	7.6			
8	B1757	雌	H23. 6.16	H24. 5. 8	243	10.9	22.2	33.1	H26. 3. 6	722	0.72	446.0	73.4	A-5	8	55	8.2			
9	B1747	去勢	H23. 5.26	H24. 4.20	302	11.0	21.9	32.9	H26. 2. 5	762	0.70	461.0	73.4	A-4	6	54	7.5	アタリ (モモ・カタ)		
10	B1755	去勢	H23. 6. 7	H24. 4.20	266	10.6	21.9	32.5	H26. 2. 5	702	0.66	432.0	77.3	A-4	6	72	8.6			
11	B1758	去勢	H23. 6.23	H24. 4.20	249	10.1	21.9	31.9	H26. 2. 5	690	0.67	419.0	77.1	A-5	9	76	7.2			
12	B1742	去勢	H23. 4. 4	H24. 4.20	331	12.7	21.6	34.4	H26. 1.29	806	0.73	494.5	74.5	A-3	5	63	8.7	シミ (ロース)		
13	B1752	去勢	H23. 6. 2	H24. 4.20	300	10.8	21.6	32.4	H26. 1.29	826	0.81	497.0	73.6	A-4	6	61	7.7			
14	B1753	去勢	H23. 6. 2	H24. 4.20	320	10.8	21.6	32.4	H26. 1.29	810	0.76	496.0	74.4	A-3	4	72	8.3	シミ (ロース)		
15	B1754	雌	H23. 6. 6	H24. 5. 8	278	11.2													H26.1.3死亡(原因不明)	
					H25 年度平均 (B1754 を除く)		267	10.4	22.2	32.6	736	0.70	449.4	74.6		6.57	63.3	7.76		
					過去 3 年間平均 (n=56) 内訳：黒毛和種去勢牛 56 頭		291	15.3	18.7	34	708	0.75	433.7	74.9		4.21	59.2	7.5		

※ H25 年度出荷肥育牛は全て放牧経験がない